


Les plantations ne sont pas très avancées pour la saison. A ce jour environ 80 % des surfaces sont implantées dans le finistère et environ 40-50% dans le morbihan et les côtes d'Armor. La perturbation de lundi a stoppé les plantations. Suivant les secteurs de forts cumuls de pluviométrie ont été enregistré, la fin la semaine ainsi que le début de la semaine prochaine restent perturbés.



Cumul entre le 12 et le 17 mai 2024. Source météo DATA.

PREMIERES LEVEE EN COURS

Les premières levées sont en cours, soit trois à quatre semaines après les plantations. Soyez vigilants pour les premières parcelles plantées.

LAVAGE DU PULVERISATEUR

- ❖ En avril et mai, de nombreuses applications de désherbage sont réalisées (maïs, blé, pomme de terre...). Penser à bien rincer et **nettoyer** le pulvérisateur avant les premières applications d'huile.
- ❖ En effet, les différentes matières actives (par exemple les désherbants et plus particulièrement les hormones et sulfonyles) se déposent sur les parois du pulvérisateur pendant et après le traitement.
- ❖ Si un grand soin n'est pas apporté au nettoyage du pulvérisateur, ces matières actives très solubles dans les corps gras vont être transférées des parois du pulvérisateur à la bouillie du traitement, **surtout si celle-ci est composée d'huile**. Ce « mélange » occasionne des brûlures ou des déformations des feuilles qui peuvent être préjudiciables pour la culture et les plants de la génération suivante (en cas d'hormones).

PUCERONS

Le piégeage en parcelle a débuté, présence en nombre modéré mais forte proportion de myzus selon les secteurs (vecteur du virus Y)

La lutte doit débuter dès 30% de levée :

- **Dès l'émergence (30 % de levée)**, intervenir tous les 3-4 jours jusqu'à la levée complète avec 7 à 8 L/ha d'huile selon la zone (voir pièce jointe pour le repérage du stade 30 % de levée).
- **A partir du stade 100 % de levée**, adapter la cadence de traitement au rythme de la pousse végétative.
 - o Maintenir, jusqu'à ce que la végétation soit stabilisé, une protection huile rapprochée 2 fois par semaine, entre 8 à 10 l pour la zone sud, pour les souches et variétés sensibles sur zone Nord Finistérienne.
 - o Pour les autres, passer progressivement sur des applications à 7 jours de 7 à 10 L d'huile/ha selon la zone, la sensibilité variétale et la vitesse de pousse des pommes de terre.



Un puceron ailé et 3 aptères sur céréale.

En annexes vous trouverez : l'aide au comptage du % de levée, le classement variétal de sensibilité au virus Y.

MILDIOU

Situation en primeur : les surfaces implantées sont inférieures aux années précédentes, du fait des conditions météo. Malgré tout, la présence de mildiou est forte dans le Finistère (80% des parcelles avec présence de taches, source BSV du 3 mai 2024) et en augmentation. Dans les Côtes d'Armor pas de parcelles touchées pour l'instant.

Au vu des conditions climatiques actuelles et dans les prochains jours, le risque est donc plutôt fort pour le Finistère et moyenne dans les Côtes d'Armor.

Pour les parcelles entre 30% et levée complète, choisir entre les trois solutions suivantes ; Leimay, Ranman Top, Zampro Max ou cuivre.

Pour les parcelles complètement levées reprendre le programme sur le guide de protection 2024.

ANNONCE

A vendre palettiseur CAPECO secteur Finistère. Tel 06 81 27 10 44.



Comptage du % de levée

PLANTES NON
LEVEES



PLANTES LEVEES



REPERES DE DECLENCHEMENT DES TRAITEMENTS D'HUILE MINERALE ET INSECTICIDES AU STADE 30%-70%-100% DE LEVEE

TYPE DE PLANTATION	BUTTES TRADITIONNELLES			BILLON 3 RANGS				
	LARGEUR ENTRE BUTTES			LARGEUR DU BILLON				
	0.75	0.80	0.85	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
LONGUEUR DE RANGS PLANTE EN KM/HA	13.33	12.5	11.76	18.75	17.64	16.66	15.79	15.00

DISTANCE A JALONNER EN METRES ENTRE 2 PIQUETS	13,33 m	12,50 m	11,76 m	18,75 m	17,64 m	16,66 m	15,79 m	15,00 m
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

➤ La distance choisie représente 0,1% d'un ha

Comptage du % de levée

➤ EXEMPLE :

- Plantation en billons sur 1,80m
- Densité : 80000 pieds / ha

DENSITE DE PLANTATION	NOMBRE DE PLANTES LEVEES ENTRE 2 JALONS SUR 1 RANG		
	30% DE LEVEE	70% DE LEVEE	100% DE LEVEE
45000	13	31	45
50000	15	35	50
55000	16	38	55
60000	18	42	60
65000	19	45	65
70000	21	49	70
75000	22	52	75
80000	24	56	80
85000	25	59	85
90000	27	63	90
95000	28	66	95
100000	30	70	100
105000	31	73	105
110000	33	77	110
115000	34	80	115
120000	36	84	120

Classement variétal sensibilité virus Y 2024

Très sensible : Y	Sensible : Y	Moyennement : Y	Peu Sensible : Y
ALASKA	BEA	ALLIANS	AGRIA
AMANDINE	BELLE DE FONTENAY	ANGELIQUE	CARA
AMBRINE	BINTJE	APOLLO	DAIFLA
ANIEL	CAPUCINE	ATLAS	DESIREE
CELTIANE	CHARLOTTE	ATOLL	HERMES
CHARMEUSE	EL BEIDA	AZILIS	KELLY
CLAIRETTE	GALANTE	BLUE BELLE	KENNEBEC
DAISY	GWENNE	CHARLENE	LADY AMARILLA
DIADEME	INSTITUT DE BEAUVAIS	CHERIE	LADY CHRISTL
DOUNIA	JOSE	DELILA	LADY ROSETTA
EDEN	JULIETTE	EMEURAUDE	MONALISA
ELODIE	KING EDWARD	KENZA	OSTARA
EUROPA	LADY CLAIRE	KERPONDY	PASSION
GOURMANDINE	LOANE	MARGOD	RIKEA
MAIWEN*	MALDIVE*	NICOLA	ROSABELLE
NAIMA	O SIRENE	NOHA	RUMBA
RATTE	ONDINE	PAMINA	SIEGLINDE
SAFRANE	ONDINE	REINE	UNIVERSA
SAHEL	PAMELA	SAMBA	VALERY
SELENA	RED PONTIAC	SOLEIA	YONA
SIRTEMA	ROSEVAL	SOPRANO	
STARLETTE	STELLA	SPUNTA	
	SYNERGY	STEMSTER	
	TOUAREG		

* variétés à risques de repousses, attention aux contaminations sur repousses

Variétés nouvelles ou en cours de classement			
Très sensible : Y	Sensible : Y	Moyennement : Y	Peu Sensible : Y
ALAMBRA	BELLATRIX	BARCELONA	BYZANCE
	CN 99 113 1	BINGO	DECIBEL
	JAZZY	DIVAA	GRENADINE
	LADY ALICIA	GEORGINA	JELLY
		HANSA	TILBURY
		LILIA	
		MONTREAL	
		RAINBOW	