

Les plantations ont repris en début de semaine et la météo de la semaine prochaine est très favorable à l'avancée des chantiers. Les premières plantations lèvent vite et poussent correctement.

SITUATION MILDIOU

La pression reste soutenue avec les températures douces, les récentes averses orageuses dans tous les secteurs, l'humidité du sol importante et les fortes rosées le matin. Maintenir la protection dans les parcelles déjà avancées en stade (voir info flash du 17 mai). Attention, quelques parcelles de plants présentent des taches de mildiou secteur Côtes d'Armor. Présence dans quelques jardins dans le Morbihan (secteur Pontivy). Présence dans les parcelles de primeur dans le Finistère.

Pour les parcelles à 100% de levée passer sur le programme avec des produits type diffusant et translaminaire (ex : Pack_Zorvec NCOZ, Révus, Infinito, Pygmalion en association). Pour la prévention des résistances veiller à bien **alterner les modes d'action des produits à chaque passage** (voir dernière colonne des tableaux pages 15 à 17 du guide protection 2024).

SITUATION PUCERONS

La pression puceron est pour l'instant faible. Malgré tout, garder une bonne protection huile dès 30% de levée. Cadencer les traitements huile tous les 3 à 5 jours jusqu'à la fin de la levée pour couvrir toutes les plantes nouvellement levées. **Attention toutefois à la montée des températures du début de semaine prochaine qui peut entraîner une accentuation des vols.**

Une dérogation de 120 jours a été accordée pour le Movento (spirotetramat 100g/l) du 1 juin au 29 septembre 2024.

Conditions d'utilisation :

- La dose applicable en pomme de terre est de 0.75 L/ha
- 4 applications autorisées espacées de minimum 7 jours
- BBCH 12 (2 feuilles) à 81 (fin de développement des tubercules)
- Ne pas appliquer en période de floraison, de production d'exsudat et sur les zones de butinage
- ZNT aquatique (Zone de Non Traitement) 5 m
- DSR (Distance de Sécurité Riverains) de 3 m
- DAR (Délai Avant Récolte) : 14 jours

Nous ne disposons pas de résultats d'essais sur ce produit en pomme de terre, il est donc difficile de statuer sur son efficacité dans le cadre de la lutte contre le virus Y. Possibilité de l'utiliser à partir du stade 10 cm avec une cadence de 21 jours.

La demande a été faite également pour le Tépéki, nous aurons la réponse officielle la semaine prochaine. La restriction pour la consommation humaine et animale sera conservée.

DESHERBAGE MAÏS

La gestion des repousses de pommes de terre est très importante dans la rotation. Dans la culture de maïs, le meilleur programme est **deux applications en post levée**.

- Exemple de programme*

- Méso-trione (60 à 75gr de s.a./ha)
+
- Dicamba 100 à 120gr de s.a./ha
+
- Anti graminées si nécessaire
(ex : nicosulfuron)

Premier passage entre 3 et 5 feuilles selon le salissement

- Méso-trione (60 à 75gr de s.a./ha)
+
- Fluroxypyr-méptyl 120gr de s.a./ha
ou
Dicamba 100gr de s.a./ha

Second passage après 8 feuilles (stade de sensibilité du maïs à certaines molécules)

*Veiller à respecter les doses maximales et le nombre d'application de chaque molécule en fonction de chaque homologation de produit.

DORYPHORES

La présence de quelques adultes est déjà observée en parcelle. Attendre d'avoir les premières larves présentes pour intervenir.

Seuil de nuisibilité = 2 foyers pour 1000m²

Foyer = au moins 20 larves au total sur 1 ou 2 plantes

Privilégier les produits les plus sélectifs des auxiliaires, Success 4 et Coragen, qui sont aussi les plus efficaces. Voir liste complète des produits page 22 du guide de protection 2024.

ANNONCES

A vendre chaîne de calibrage BILSMA, avec tapis, remplisseur de caisses et de big bag. Secteur Finistère.

Tel : 06.72.82.64.28.

Recherche une quinzaine de palox de 750 kg.

Tel : 06.33.46.00.65

