


Les plantations vont reprendre en ce début de semaine. Les premières levées sont en cours. Surveillez donc vos parcelles pour les premières applications d'huile dès 30% de levée.



Pluviométrie du 25 au 27 avril 2025 (source meteodata.fr)

## LAVAGE DU PULVERISATEUR

- ❖ En avril et mai, de nombreuses applications de désherbage sont réalisées (maïs, blé, pomme de terre...). Pensez à bien rincer et **nettoyer** le pulvérisateur avant les premières applications d'huile.
- ❖ En effet, les différentes matières actives (par exemple les désherbants et plus particulièrement les hormones et sulfonyles) se déposent sur les parois du pulvérisateur pendant et après le traitement.
- ❖ Si un grand soin n'est pas apporté au nettoyage du pulvérisateur, ces matières actives très solubles dans les corps gras vont être transférées des parois du pulvérisateur à la bouillie du traitement, **surtout si celle-ci est composée d'huile**. Ce « mélange » occasionne des brûlures ou des déformations des feuilles qui peuvent être préjudiciables pour la culture et les plants de la génération suivante (en cas d'hormones).
- ❖ Un rinçage à l'eau se suffit pas, préférez un **lavage** avec un produit adapté. Exemple : Tecnet GD, VégéNet...


## *PUCERONS, PROTECTION HUILE ET FONGICIDE*

Le piégeage en parcelle va débuter en ce début de semaine, les premiers bacs ont été disposés en fin de semaine dernière. Nous vous tiendrons informés des niveaux de pucerons piégés dès que nous aurons les premiers résultats. Quoiqu'il en soit, commencez la protection dès que le stade des 30% de plantes levées est atteint. La pression mildiou reste assez élevée donc en fonction des secteurs, complétez par un fongicide en même temps que les applications d'huile.

La lutte doit débuter dès 30% de levée :

- **Dès l'émergence (30 % de levée)**, intervenir tous les 3-4 jours jusqu'à la levée complète avec 7 à 8 L/ha d'huile selon la zone (voir pièce jointe pour le repérage du stade 30 % de levée).
- **A partir du stade 100 % de levée**, adapter la cadence de traitement au rythme de la pousse végétative.
  - o Maintenir, jusqu'à ce que la végétation soit stabilisée, une protection huile rapprochée 2 fois par semaine, entre 8 à 10 l pour la zone sud, pour les souches et variétés sensibles sur zone Nord Finistérienne.
  - o Pour les autres, passez progressivement sur des applications à 7 jours de 7 à 10 L d'huile/ha selon la zone, la sensibilité variétale et la vitesse de pousse des pommes de terre.

En annexes vous trouverez : l'aide au comptage du % de levée, le classement variétal de sensibilité au virus Y.




Plantation du 1<sup>er</sup> Avril,  
photo du 29 avril 2025  
35-40% de levée.

# Comptage du % de levée

PLANTES NON  
LEVEES



PLANTES LEVEES



REPERES DE DECLENCHEMENT DES TRAITEMENTS D'HUILE MINERALE  
ET INSECTICIDES AU STADE 30%-70%-100% DE LEVEE

TYPE DE PLANTATION	BUTTES TRADITIONNELLES			BILLON 3 RANGS				
	LARGEUR ENTRE BUTTES			LARGEUR DU BILLON				
LONGUEUR DE RANGS PLANTE EN KM/HA	0.75	0.80	0.85	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00
	13.33	12.5	11.76	18.75	17.64	16.66	15.79	15.00
DISTANCE A JALONNER EN METRES ENTRE 2 PIQUETS	13,33 m	12,50 m	11,76 m	18,75 m	17,64 m	16,66 m	15,79 m	15,00 m

➤ La distance choisie représente 0,1% d'un ha

## Comptage du % de levée

### ➤ EXEMPLE :

- Plantation en billons sur 1,80m
- Densité : 80000 pieds / ha

DENSITE DE PLANTATION	NOMBRE DE PLANTES LEVEES ENTRE 2 JALONS SUR 1 RANG		
	30% DE LEVEE	70% DE LEVEE	100% DE LEVEE
45000	13	31	45
50000	15	35	50
55000	16	38	55
60000	18	42	60
65000	19	45	65
70000	21	49	70
75000	22	52	75
80000	24	56	80
85000	25	59	85
90000	27	63	90
95000	28	66	95
100000	30	70	100
105000	31	73	105
110000	33	77	110
115000	34	80	115
120000	36	84	120

## Classement variétal sensibilité virus Y 2025

Très sensible : Y	Sensible : Y	Moyennement : Y	Peu Sensible : Y
ALASKA	BEA	ALLIANS	AGRIA
AMANDINE	BELLE DE FONTENAY	APOLLO	CARA
AMBRINE	BINTJE	ATLAS	DAIFLA
ANIEL	CHARLOTTE	ATOLL	DESIREE
CELTIANE	EL BEIDA	AZILIS	HERMES
CHARMEUSE	GALANTE	CHARLENE	KELLY
DAISY	GWENNE	CHERIE	KENNEBEC
DOUNIA	INSTITUT DE BEAUVAIS	DELILA	LADY AMARILLA
EDEN	JOSE	EMEURAUDE	LADY CHRISTL
ELODIE	KING EDWARD	KERPONDY	LADY ROSETTA
EUROPA	LADY CLAIRE	MARGOD	MONALISA
GOURMANDINE	LOANE	NICOLA	OSTARA
MAIWEN*	MALDIVE*	NOHA	PASSION
NAIMA	O SIRENE	PAMINA	RIKEA
RATTE	ONDINE	REINE	ROSABELLE
SAFRANE	RED PONTIAC	SAMBA	RUMBA
SAHEL	ROSEVAL	SOLEIA	SIEGLINDE
SELENA	STELLA	SOPRANO	UNIVERSA
SIRTEMA	SYNERGY	SPUNTA	VALERY
STARLETTE	TOUAREG	STEMSTER	YONA

\* variétés à risques de repousses, attention aux contaminations sur repousses

<b>Variétés nouvelles ou en cours de classement</b>			
Très sensible : Y	Sensible : Y	Moyennement : Y	Peu Sensible : Y
COLAMBA	BELLATRIX	BARCELONA	BYZANCE
	CN 99 113 1	BINGO	DECIBEL
	JAZZY	DIVAA	GRENADINE
	LADY ALICIA	GEORGINA	JELLY
	SIFRA	HANSA	TILBURY
	NAJAH	LILIA	SAGITTA
	PUNCHY	MONTREAL	AGATA
		RAINBOW	
		TOPAZE	
		HARRY	
		GALINA	

