

## ATTAQUES D'ANIMAUX ET ZONOSES

En visite de parcelles et d'exploitations, le risque de mauvaises rencontres avec des animaux existe. Il entraîne un risque de morsures ou piqûres plus ou moins graves, de traumatismes suite à un coup, d'infection d'une plaie après morsure ou piqûre. Il peut également entraîner la contraction de maladies et zoonoses (tétanos, rage, pasteurellose...), ou maladies d'animaux transmissibles à l'homme.

De manière générale, lors de vos sorties en parcelles :


- Observez la zone de travail et signalez la présence d'animaux errants à la commune.
- Portez des vêtements couvrants (pantalons, bottes...), en particulier du printemps à l'automne pour éviter les piqûres de tiques ;
- Ne touchez pas des animaux morts, évitez les contacts directs avec les animaux sauvages.

### L'attaque et la morsure de chien :

Pour un adulte le risque principal se situe au niveau des mains : traumatisme articulaire ou tendineux, plaie qui peut ensuite s'infecter et/ou transmettre une maladie (via bactérie, parasite ou champignon). Les infections éventuelles se manifestent en général environ 24 heures après la morsure. Mais il y a aussi un risque de chute ou traumatisme si le chien vous bouscule.

Un chien n'attaque jamais gratuitement (il prévient ce qu'il a ou qu'on lui a défini comme son territoire) et prévient avant d'attaquer, avec différentes étapes.

Attention, un chien qui remue la queue n'est pas forcément joyeux. Une queue qui bouge rapidement et de manière rigide peut indiquer une menace. De même s'il se lèche les babines, baille excessivement, évite votre regard ou a la queue entre les jambes, c'est qu'il a peur. Il sera plus susceptible de vous attaquer s'il n'a pas d'échappatoire.



### Mesures de prévention :

Faire enfermer ou attacher le chien avant votre arrivée.

Reconnaître les signes extérieurs donnés par l'animal d'une éventuelle attaque :

- Oreilles en arrière
- Queue entre les pattes
- Poils de la nuque/ du dos retroussés
- Claquements de dents, Crocs sortis
- Grognements

Votre première ligne de défense est vos vêtements. Autant que faire ce peu, portez une tenue couvrante et un tissu épais.

### Conduite à tenir en cas de menace :

- Observer son comportement (voir plus haut)
- Rester calme, s'immobiliser, pas de mouvements brusques qu'il puisse interpréter comme une menace et ne pas élever la voix
- Ne pas le regarder dans les yeux
- Ne pas lui tourner le dos, reculer en marche arrière pour s'éloigner d'un pas assuré
- Ne pas caresser un chien inconnu, errant
- Ne pas le contraindre dans un espace où il n'y a pas d'issue
- Planter un bâton type bâton de marche entre vous et le chien peut suffire à le dissuader de vous attaquer.

### Conduite à tenir en cas d'attaque :

- Eviter cris et fuite qui attiseraient son instinct de poursuite
- Lui lancer quelque chose qu'il pourra manger/mâcher ou courir après et attraper : votre casquette, un bâton, sac, bouteille... ou qui pourra vous protéger en mettant de la distance entre vous et le chien,
- Si la différence de poids vous le permet, utiliser la force de poids du corps pour repousser l'animal,
- Si vous êtes acculé, protéger vos zones vitales : gorge, ventre, en vous mettant en position fœtale, ou croiser les bras devant vous
- Et vous éloigner rapidement.

### Conduite à tenir en cas de morsure :

- Laver au plus vite et longuement à l'eau et au savon la zone touchée
- Recueillir les données concernant l'animal si c'est possible (carnet de santé...)
- Alerter la police, le contrôle animalier ou la mairie, surtout en cas d'animal errant
- Faire faire une déclaration d'accident du travail
- Surveiller l'évolution de la blessure et consulter un médecin en cas de signe d'aggravation. Les infections éventuelles se manifestent 12 à 24 h après la morsure.

## La morsure de serpent :

En France les morsures graves sont principalement dues aux vipères. Vous les distinguerez des couleuvres par leur tête triangulaire, de petites écailles, un corps plus trapu, une queue courte et des pupilles verticales.

Les serpents sortent essentiellement par temps chaud et humide et ne mordent que pour se défendre lorsqu'on leur marche dessus ou qu'on les approche. Une fois sur 2 ils n'injectent pas de venin. Cette morsure n'engendre que des symptômes locaux (douleur au point de morsure).

En cas d'injection de venin, la douleur est beaucoup plus vive, un gonflement et une rougeur apparaissent au niveau de points de morsure. Au bout de 30' à plusieurs heures des signes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), cardio vasculaires (malaise, chute de tension...), une gêne respiratoire, une confusion peuvent apparaître.

Risques possibles : violente douleur pouvant provoquer une chute de plain-pied, malaise, œdème allant jusqu'au choc anaphylactique, infection de la morsure...

### Mesures de prévention :

- Observer l'environnement : contrôle visuel de l'endroit où l'on pose les pieds, éviter de s'approcher d'un tas de pierres
- Ne pas intervenir en présence du serpent, ou intervenir prudemment
- Eviter autant que faire ce peut le travail isolé, disposer d'un téléphone portable
- Porter des chaussures fermées et montantes ou des bottes et un pantalon
- Se déplacer bruyamment, frapper et agiter les broussailles avec un bâton
- Avoir sur soi un sérum si on est allergique.

### Conduite à tenir en cas de morsure :

- Se soustraire au danger et se mettre au repos si possible
- Observer les signes de symptômes et appeler les secours
- Ôter bagues, montres, chaussures, tout ce qui peut serrer la zone mordue
- Nettoyer la plaie à l'eau et au savon
- Immobiliser le membre mordue
- Essayer de noter des indications sur le serpent : taille, couleur, forme de tête, pour renseigner les secours.

### Ce qu'il ne faut surtout pas faire :

- Poser un garrot ou un bandage compressif, inciser ou compirmer la plaie
- Poser de la glace sur la morsure.

## La piqûre de tique :

La tique aime la chaleur, les herbes hautes, l'humidité et se rencontre surtout au printemps et à la fin de l'automne.

Le principal risque est que sa piqûre transmette la maladie de Lyme, une infection longue durée parfois difficile à éradiquer qui peut notamment provoquer dans les cas les plus graves une fièvre hémorragique.

Elle cherche à piquer préférentiellement les zones de peau humide : pli des genoux, aisselles, cuir chevelu...).

Plus la tique reste longtemps fixée plus le risque de transmission de maladie augmente.\*

### Mesures de prévention :

- Inspecter autant que possible en période sèche
- Avoir un tire tic dans sa trousse de secours
- Comme pour les serpents : porter des chaussures fermées et montantes ou des bottes et un pantalon, voire des manches longues resserrées aux poignets
- Préférer les vêtements de couleur claire, rentrer les bas de pantalon dans les chaussettes
- Utiliser un produit répulsif contre les insectes sur les zones de peau non couvertes
- Inspecter le corps en fin de journée et retirer les tiques s'il y en a (tirer en tournant pour dégager la tête).

### Conduite à tenir en cas de piqûre :

- Désinfecter
- Surveiller le point de piqûre et son évolution pendant les semaines suivantes : une plaque rouge qui s'étend de manière circulaire en ayant pour point de départ le site de morsure dans les semaines qui suivent la morsure signifie que la personne a été infectée par une borréliose et que sans traitement antibiotique adapté, elle peut développer les symptômes d'une maladie de Lyme. Un **syndrome grippal** avec de la **fièvre**, des **maux de tête**, des **douleurs musculaires** et **articulaires**, une grande **fatigue** peuvent accompagner l'érythème migrans. Il est alors nécessaire de faire une prise de sang pour dépister la maladie de Lyme.



Donc consulter un médecin si une plaque rouge apparaît.