

Les conditions météorologiques restent très chaudes pour les prochains jours et il n'y a pas de perturbation d'annoncée pour l'instant. Pour ceux qui le peuvent, continuez l'irrigation. La situation pucerons s'améliore.

PUCERONS

La situation de ces derniers jours est beaucoup plus calme. Continuez toutefois la protection et l'épuration sur les dernières parcelles plantées.

Lieu	3-4 juillet
Bieuzy	8 pucerons/jour
Cléguérec	4 pucerons/jour
Hanvec	2 pucerons/jour

MILDIOU

Il reste quelques parcelles avec du mildiou actif, restez vigilants, l'objectif étant qu'il ne descende pas aux tubercules.

DEMONSTRATION DEFANAGE MECANIQUE

Vous trouverez en PJ l'invitation pour deux après-midis, de démonstration défanage mécanique, les 15 et 16 juillet prochains. Nous communiquerons vendredi prochain la localisation des parcelles.

ENTRETIEN LOCAUX ET MATERIEL DE STOCKAGE

La maîtrise sanitaire de la récolte et de la conservation se prépare dès maintenant. Avant de pouvoir désinfecter les caisses et les bâtiments il est préférable :

1. D'aspirer / balayer les surfaces (sol, plafonds, parois, système de ventilation), en effet les poussières contiennent un grand nombre de spores de champignons comme la fusariose...
2. Laver soigneusement les locaux de stockage, les caisses et le matériel

C'est un **moyen de lutte prophylactique efficace** contre plusieurs maladies qui peuvent être préjudiciables : fusariose, galle argentée, jambe noire...

DEFANAGE

Lors du défanage, plusieurs priorités sont à prendre en compte :

1- **Attendre que les cultures soient défleuries** avant de commencer le défanage et que **les lenticelles des tubercules soient refermées**. Cela est une potentielle entrée des maladies et risque également de nuire à la qualité (défaut de présentation).

2- **Réaliser un test de matière sèche sur les parcelles arrivées au calibre avec des végétations restées vertes ou ayant eu une levée échelonnée**. Le seuil de 16 % est un minimum pour une majorité de variétés, 17 % est souhaitable. Pour des taux plus bas de matière sèche, consulter votre technicien.

❖ Conseils :

➤ **Privilégier le broyage** pour une meilleure maîtrise des calibres :

- **En cas de mildiou ou traces de jambe noire, broyer en conditions sèches.**

- **1 à 2 jours** après le broyage :

SPOTLIGHT PLUS 1 L/ha	OU	DOLBI (Sorcier + Brasero) 0,8 L/ha 1,6 L/ha	OU	GOZAI MAX (Gozaï + Beloukha) 0,8 L/ha 1,6 L/ha
---------------------------------	-----------	--	-----------	---

- **Si nécessaire, 4 à 6 jours** après : **SPOTLIGHT PLUS** de 0,8 à 1 L/ha.

SPOTLIGHT PLUS 0,8 à 1 L/ha	OU	DOLBI (Sorcier + Brasero) 0,8 L/ha 1,6 L/ha	OU	GOZAI MAX (Gozaï + Beloukha) 0,8 L/ha 1,6 L/ha
---------------------------------------	-----------	--	-----------	---

➤ **Défanage 100 % chimique** : sur les cultures en senescence sans risque de grossissement rapide

- **2 passages espacés de 4 à 6 jours**, sur végétation sèche en matinée.

SPOTLIGHT PLUS 1 L/ha	OU	DOLBI (Sorcier + Brasero) 0,8 L/ha 1,6 L/ha	OU	GOZAI MAX (Gozaï + Beloukha) 0,8 L/ha 1,6 L/ha
---------------------------------	-----------	--	-----------	---

Les produits défanants sont plus efficaces en **journées lumineuses et ensoleillées**.

- **En cas de mildiou en fin de culture**, on peut associer RANMAN TOP 0,5L/ha ou du fluazinam (produits sporicides) **AVEC** le défanant **SAUF avec le BRASERO**, ou avant le défanage

- **Pour les plants personnels et les variétés sensibles aux virus**, continuer la protection huile pendant le défanage

LUTTE CONTRE LES TAUPINS EN INTERCULTURE

Le taupin au stade jeune est sensible au travail du sol et aux conditions sèches. En effet, les œufs fraîchement pondus ainsi que les jeunes larves peuvent être détruits juste après la récolte des céréales. Les céréales étant des cultures de pontes, **le déchaumage est un moyen de lutte efficace**. Dans les parcelles touchées par le taupin, privilégiez deux passages d'outils à dents en surface, avant le semis des couverts.

COUVERTS VEGETAUX

L'implantation d'un couvert végétal dès la moisson est indispensable pour réussir une bonne couverture et une forte biomasse.

Un bon couvert va aussi permettre une bonne structuration du sol pendant l'hiver (travail des racines, impact de l'eau réduit sur le sol), ce qui va permettre un ressuyage plus rapide, et donc faciliter la reprise des sols en sortie d'hiver.

Les couverts qui produisent une biomasse assez importante, permettent de capter une quantité non négligeable d'azote (et de nombreux autres éléments minéraux !).

L'objectif est de réaliser un semis le plus rapidement possible après la récolte de la culture. Un décompactage ou plutôt une fissuration à 30 cm (outil à dents fines espacées de 30 cm avec un travail à vitesse réduite) peut être intéressant avant le semis des couverts, cela va permettre aux racines de descendre plus facilement dans les différents horizons.

Le déchaumage n'est pas forcément conseillé car cela peut dessécher la surface et impacter la levée du couvert. Par contre, en cas de lutte contre les taupins, deux déchaumages superficiels rapprochés peuvent être envisagés en conditions ensoleillées. Après une culture d'orge, réalisez un faux semis par un déchaumage pour limiter les repousses d'orge dans le couvert. Dans le cas de récolte précoce (orge, pois, colza) il est possible de privilégier des espèces qui peuvent être semées tôt en fin juillet - début août (cf. guide technique)

Ne pas hésitez à augmenter la dose de semis pour améliorer la couverture du sol et réduire la présence d'adventices, ceci aura aussi un impact positif sur la biomasse produite.

Le semis avec un combiné est à privilégier pour assurer une levée homogène.

Un roulage est fortement conseillé après semis pour assurer un bon contact sol-graine, d'autant plus en conditions sèches.

